ÍNDICES DE PSICOPATOLOGÍA EN PROFESIONALES SANITARIOS DE ÁMBITO HOSPITALARIO

G. Benavides, F. Martínez, C.J. van-der Hofstadt, M. Orgilés y A. Solanes

Dpto. Psicología de la Salud Universidad Miguel Hernández de Elche

VI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés

Benidorm, 21-23 de Septiembre de 2006

INTRODUCCIÓN

Vulnerabilidad a la morbilidad psiquiátrica en personal sanitario


(Alonso Fernández, 1993; De la Gándara, 1994; Madueño y cols., 2002; Martínez, 2005).



OBJETIVO

Estudio diferencial de la presencia de sintomatología psicopatológica en profesionales sanitarios de ámbito hospitalario, en función de diferentes variables sociodemográficas y condiciones laborales.

METODOLOGÍA




MUESTRA


418 profesionales sanitarios pertenecientes a las Áreas de Salud 15, 16, 19 y 20 de la provincia de Alicante.

VARIABLE	X	D.T.
Edad Años en la profesión	38.6 15.82	10.05 9.64
Años en el puesto actual	8.02	7.08
Horas dedicadas al trabajo	38.8	7.04
Nº pacientes atención diaria	14.07	12.28
Nº guardias o turnos noche al mes	3.67	4.05


Hospitales




Servicios




Sexo



Profesión




Categoría profesional




- **M** Directivo
- M Jefe servicio
- M Adjunto
- MIR
- **ATS/DUE**
- **E Especialista**
- **■** E Supervisor


Horario laboral



Otro trabajo



Tipo de plaza



INSTRUMENTOS

- Hoja de toma de datos
- SCL-90-R (Derogatis, 2002)
 - -Índices globales de malestar: GSI, PST Y PSDI
 - -Dimensiones sintomáticas de psicopatología: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo.

PROCEDIMIENTO


- Petición de permisos a los hospitales
- Distribución de baterías de evaluación
- Seguimiento de la cumplimentación de las pruebas y recogida
- Mecanización de los datos y análisis estadísticos

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS


Versión 13.0.1. del paquete estadístico SPSS para Windows.

- Descriptivos
- Análisis de correlaciones
- Prueba T de Student
- Análisis de varianza

RESULTADOS



PERFIL MUESTRA GENERAL



Escalas SCL-90-R

CORRELACIÓN DE PEARSON

Edad Ideación paranoide .133*

Años en la profesión Ideación paranoide .109*


PRUEBA T

		t	Dif. X
Sexo	GSI	-2.33*	148
	Somatización	-3.04**	244
	Depresión	-2.29*	189
Profesión	Ansiedad fóbica	-1.97*	092
	Psicoticismo	-1.94*	089
Tipo plaza	PST	1.91*	3.86
	Ideación paranoide	2.27*	.144

ANOVA

	F		Dif. X
Categoría profesional	Somatización 3.595**	Directivo-Adjunto Adjunto-ATS Adjunto-Especialista	.463** 327* 534**
Horario laboral	Somatización 2.548*	Mañana-Otros Jornada partOtros	902* -1.095*

CONCLUSIONES



- Perfil SCL-90-R por encima del promedio de la población general.
- Índices de mayor psicopatología relacionados con la edad, los años en la profesión, el sexo femenino, el personal de enfermería, y los horarios de trabajo irregulares.

ÍNDICES DE PSICOPATOLOGÍA EN PROFESIONALES SANITARIOS DE ÁMBITO HOSPITALARIO

G. Benavides, F. Martínez, C.J. van-der Hofstadt, M. Orgilés y A. Solanes

Dpto. Psicología de la Salud Universidad Miguel Hernández de Elche

VI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés

Benidorm, 21-23 de Septiembre de 2006